

FITOESTRIL®

L'AZIONE SINERGICA E COMPLEMENTARE DI TUTTI I SUOI ESTRATTI CONCORRE IN MODO EQUILIBRATO E COMPLETO AD ALLEVIARE IL QUADRO DEI DISTURBI FUNZIONALI NELLE DONNE IN MENOPAUSA DOVUTI ALLA DIMINUIZIONE DEI LIVELLI ORMONALI DI ESTROGENO E DI PROGESTERONE

MODALITÀ D'USO

1-2 compresse al dì.

Una compressa contiene:

TRIFOGLIO	e.s.	mg 200	20% in isoflavoni totali
DIOSCORREA	e.s.	mg 100	20% in Diosgenina
CRATAEGO	e.s.	mg 100	1,5% in Vitexina
GRIFFONIA	e.s.	mg 60	95% in 5-idrossitriptofano
Vitamina E		mg 7,5	
Vitamina D3		mcg 3,75	
Zinco		mg 5	



senza glutine
adatto ai vegani

30 compresse

FITOESTRIL®

1 AZIONE SU ENTRAMBI I SITI RECETTORIALI ESTROGENICI

Una compressa contiene:

TRIFOGLIO	e.s.	mg 200
DIOSCORREA	e.s.	mg 100
CRATAEGO	e.s.	mg 100
GRIFONIA	e.s.	mg 60
Vitamina E		mg 7,5
Vitamina D3		mcg 3,75
Zinco		mg 5

BLOCCO RECETTORI ALFA





STIMOLO RECETTORI BETA

AZIONE ANTI-ESTROGENICA
MAMMELLA ED UTERO

effetto agonista/antagonista

AZIONE PRO-ESTROGENICA
DISTURBI E MODIFICAZIONI MENOPAUSALI

2 RIDURRE IL GAP ESTRO-PROGESTINICO IN MENOPAUSA




FITOESTRIL®

3 CONTROLLARE I DISTURBI E LE MODIFICAZIONI

Una compressa contiene:

TRIFOGLIO	e.s.	mg 200
DIOSCORREA	e.s.	mg 100
CRATAEGO	e.s.	mg 100
GRIFFONIA	e.s.	mg 60
Vitamina E		mg 7,5
Vitamina D3		mcg 3,75
Zinco		mg 5



Studio multicentrico Fitoestril

EFFETTI DI UN FITOCOMPLESSO SUL BENESSERE DELLA DONNA INCLIMATERIO

Quattrocchi T1., Micali E.2, Gentile A.3, La Ferrera G. 4, Barbaro L. 5, Ciarcià S. 6, Corrado F. 1, Di Costa M. 7, Fazio R. 8, Licenziato R. 9, Marcazzò A. 10, Minniti R. 11, Riccobene R. 12, Russello C.M. 13, Cancellieri F1.

Razionale scientifico: Valutare gli effetti di Fitoestril a breve e medio termine sui parametri neurovegetativi e vasomotori.

Criteria di Inclusione

- Amenorrea da almeno 12 mesi
- Wash-out di 3 mesi dall'uso di preparati contro i sintomi climaterici
- Pazienti con sintomatologia vasomotoria

Criteria di Esclusione

- Patologia neoplastica maligna
- Uso in contemporanea di preparati contro i sintomi della climaterici
- Ipertiroidismo riferito e non compensato
- Metrorragia in atto
- Patologie neuro-psichiatriche

12 Centri (7 consultori, 4 ospedali, 1 centro privato)

151 Donne arruolate: donne in menopausa da almeno 12 mesi, con sintomi climaterici.

131 Donne che hanno completato lo studio: Età media : 54,76 anni


6 mesi la Durata dello studio

Posologia Fitoestril: 2 cpr al dì per i primi 15 gg, poi 1 cpr al dì sino a 6 mesi

Scala di Greene (Greene, 1998) che mira a valutare l'intensità della sindrome climaterica

Beck Depression Inventory (BDI) (Beck, 1961), per misurare la gravità e la profondità della sintomatologia depressiva

1 Valutazione scale di Beck e di Green T0-T6




Valutazione 1 :
T0 / T6 =
reclutamento / sesto mese

Studio multicentrico Fitoestril



2 Andamento totale medio dei 5 parametri



T1 + T3 + T6 dei 5 parametri della scala di Greene (vampate, sudorazione, insonnia, tensione nervosa e stanchezza)

3 Andamento totale dei singoli sintomi

